

褥瘡推定有病率・発症率

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率	有病率	発症率
2016	9.3	5.6	10.6	6.2	10.2	5.6	16	7.7	9.9	4	8.5	5.5	7.2	4.8	10.1	6.3	9	5.8	7.5	4.2	11	5.5	7.5	2.8
2017	8.1	3.8	8.8	3.4	9.1	2	9.5	2	10.6	3.2	10	3.5	7.6	2.9	4.9	1.7	6.1	2.8	6.5	3.7	11.2	3.6	12	4
2018	11.6	4.6	8.7	1.2	2.9	1.2	6.3	1.4	9.4	2.8	7	1.2	5.3	0.4	5.5	1	3.7	1.8	2.8	1.4	4.3	1.2	2.8	1.1
2019	6.3	2.3	2.3	0.4	1.8	0.9	2.3	0.9	4.4	0.9	2.5	1	4	2	4.6	2	4.5	1.7	3.7	2	4	1	3.8	2.2
2020	4.5	0.6	5.8	2.6	5.1	1.4	6.6	2.4	4.8	1														

調査日に褥瘡を保有する患者

調査日に褥瘡を保有する患者 - 褥瘡持ち込み患者

褥瘡有病率(%) = 調査日の施設入院患者 × 100

褥瘡推定発症率(%) = 調査日の施設入院患者 × 100

