

## 褥瘡推定有病率・発症率

|      | 4月  |     | 5月  |     | 6月  |     | 7月  |     | 8月   |     | 9月  |     | 10月 |     | 11月 |     | 12月 |     | 1月  |     | 2月   |     | 3月  |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
|      | 有病率 | 発症率 | 有病率 | 発症率 | 有病率 | 発症率 | 有病率 | 発症率 | 有病率  | 発症率 | 有病率 | 発症率 | 有病率 | 発症率 | 有病率 | 発症率 | 有病率 | 発症率 | 有病率 | 発症率 | 有病率  | 発症率 | 有病率 | 発症率 |
| 2017 | 8   | 3.8 | 8.8 | 3.4 | 9.1 | 2   | 9.5 | 2   | 10.6 | 3.2 | 10  | 3.5 | 7.6 | 2.9 | 4.9 | 1.7 | 6.1 | 2.8 | 6.5 | 3.7 | 11.2 | 3.6 | 12  | 4   |
| 2018 | 12  | 4.6 | 8.7 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 6.3 | 1.4 | 9.4  | 2.8 | 7   | 1.2 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 1   | 3.7 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 4.3  | 1.2 | 2.8 | 1.1 |
| 2019 | 6   | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 4.4  | 0.9 | 2.5 | 1   | 4   | 2   | 4.6 | 2   | 4.5 | 1.7 | 3.7 | 2   | 4    | 1   | 3.8 | 2.2 |
| 2020 | 5   | 0.6 | 5.8 | 2.6 | 5.1 | 1.4 | 6.6 | 2.4 | 4.8  | 1   | 7.9 | 3.3 | 7.5 | 2.5 | 4.8 | 1.9 | 6.2 | 1.8 | 5.7 | 1   | 6    | 2   | 6.9 | 2.3 |
| 2021 | 4   | 2   | 5.6 | 2.2 | 8.8 | 2.7 | 5.5 | 1   | 8.6  | 1.7 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |

調査日に褥瘡を保有する患者

調査日に褥瘡を保有する患者 - 褥瘡持ち込み患者

褥瘡有病率(%) = 調査日の施設入院患者 × 100

褥瘡推定発症率(%) = 調査日の施設入院患者 × 100

