

| 対象疾患 | レジメン名     | 実施部門 | 抗がん剤適応分類 |
|------|-----------|------|----------|
| 胆道癌  | S-1 + GEM | 入院   | 進行・再発癌   |
|      |           | 外来   |          |
|      |           |      |          |

| No. | 抗癌剤(商品名) | 一般名              | 略称  | 1日投与量(/m <sup>2</sup> )       | 投与方法 | 時間   | 投与日(d1,d8等) |
|-----|----------|------------------|-----|-------------------------------|------|------|-------------|
| 1   | ティーエスワン  | テガフル・キメラシル・オテラシル | S-1 | BSA < 1.25, <i>60mg</i>       | 内服   |      | 14日服用7日休薬   |
|     |          |                  |     | 1.25 ≤ BSA < 1.5, <i>80mg</i> |      |      |             |
|     |          |                  |     | BSA ≥ 1.5, <i>100mg</i>       |      |      |             |
| 2   | ジェムザール   | ゲムシタビン           | GEM | 1000mg/m <sup>2</sup>         | 点滴静  | 30分※ | d1,d8       |

投与間隔(1コース期間): 3週

総コース数:

前投薬:

特記事項: ※ジェムザールの点滴を60分以上かけて行うと副作用が増強する恐れあり。