

レジメン名(略語): PEMBRO+wPTX+CBDCA(AUC5)		適応癌種: 乳癌	
入外区分: ☐ 入院のみ ☒ 入外	適応分類:	☐ 進行・再発	☒ 術前化学療法
		☐ その他	☐ 術後化学療法
内服併用: ☒ あり ☐ なし			

使用薬剤(内服併用の場合は内服薬剤も記載)

RP	薬品名(略号)	1日投与量	投与法	投与時間	投与日(d1等)
1	生食250mL	1袋	静注	ルートキープ°	day1.8.15
2	キイトルーダ点滴静注100mg	2V			
	生食100mL	1V	静注	30分	day1
3	生食50mL	1V	静注	10分(フラッシュ)	day1
4	デカドロン注3.3mg	2A			
	ファモチジン注20mg	1A			
	ホラミン注5mg	1A			
	パロノセトロン注0.75mg※	1A			
	生食50mL	1V	静注	全開	day1.8.15
5	パクリタキセル注	80mg/m ²			
	ブドウ糖注5%250mL	1袋	静注	60分	day1.8.15
6	カルボプラチン注	AUC5			
	ブドウ糖注5%250mL	1袋	静注	30分	day1
1コースの日数: 21日			通常総コース数: 4		
その他(特記事項) day1 イメンドカプセル125mg、day2-3 イメンドカプセル80mg内服。 ※パロノセトロン注0.75mg はday1のみ投与。					

