

レジメン名(略語): Pembrolizumab + GC		適応癌種: 胆道癌	
入外区分: ☐ 入院のみ ☒ 入外	適応分類:	☒ 進行・再発	☐ 術前化学療法
		☐ その他	☐ 術後化学療法
内服併用: ☐ あり ☒ なし			

使用薬剤(内服併用の場合は内服薬剤も記載)

RP	薬品名(略号)	1日投与量	投与法	投与時間	投与日(d1等)
1	カーミパック生理食塩 1000mL	1袋			
	硫酸Mg補正液 20mEq/A	1A	静注	ルートキープ	day1,8
2	キイトルーダ点滴静注100mg/4mL	2V			
	生食100mL/V	1V	静注	30分	day1
3	生食50mL/V	1V	静注	ゆっくりと	day1
4	20% マンニトール注 300mL/V	1V	静注	60分	day1,8
5	パロセトロン静注0.75mg 5mL/V	1V			
	デカロン注3.3mg 1mL/A	3A			
	生食100mL/V	1V	静注	15分	day1,8
6	シスプラチン点滴静注	25mg/m ²			
	生食250mL/袋	1袋	静注	60分	day1,8
7	ゲムシヒン点滴静注	1000mg/m ²			
	生食100mL/V	1V	静注	30分	day1,8
1コースの日数:21日			通常総コース数:8コース		
その他(特記事項)					
Pembrolizumab＋GC療法を最大8コース施行後、Pembrolizumab＋GEMに移行。					