

レジメン名(略語): zolbetuximab + CAPOX		適応癌種: 胃癌	
入外区分: ☐ 入院のみ ☒ 入外	適応分類:	☒ 進行・再発	☐ 術前化学療法
		☐ その他	☐ 術後化学療法
内服併用: ☒ あり ☐ なし			

使用薬剤(内服併用の場合は内服薬剤も記載)

RP	薬品名(略号)	1日投与量	投与法	投与時間	投与日(d1等)
1	パロノセトロン静注(0.75)	1V			
	デカドロン注射液(3.3)	3A			
	生食100mL	1V	静注	30分	day1
2	ビロイ点滴静注用	初回 800mg/m ²			
		2回目以降 600mg/m ²			
	注射用水20mL	2A			
	生食500mL	1袋	静注	※2時間以上かけて	day1
3	生食50mL	1V	静注	フラッシュ用	day1
4	エルプラット点滴静注	130mg/m ²			
	ブドウ糖250mL	1袋	静注	2時間	day1
5	カペシタビン錠	2000mg/m ² /分2	内服		day1 夕-day15 朝
1コースの日数: 21日			通常総コース数:		
その他(特記事項) 高度催吐性リスク抗がん剤薬に対する制吐療法に準じる。 初回は入院にて導入。 day1 イメンドカプセル125mg、day2-3 イメンドカプセル80mg内服。 ※忍容性が良好な場合は30～60分後以降は徐々に投与速度を上げることができる。					